

Jodtabletten für die Schweiz

Informationen für Abgabeverantwortliche
in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen

JODTABLETTENVERSAND SCHWEIZ

Eine vorsorgliche Schutzmassnahme

Jodtabletten (Kaliumiodid 65 SERB Tabletten) gehören zu den vorsorglichen Schutzmassnahmen des Bundes für den Fall eines schweren Kernkraftwerkunfalls. Sie verhindern, dass radioaktives Jod in die Schilddrüse aufgenommen wird. Die Tabletten werden alle zehn Jahre an die Bevölkerung im Umkreis von 50 km eines Schweizer Kernkraftwerks verteilt.



Achtung: Inhalt der Lagerpackung nur auf Anordnung der Behörden verteilen!

Anwendung

Wirkung der Tabletten

Bei rechtzeitiger Einnahme verhindern die hoch dosierten Kaliumiodid 65 SERB Tabletten, dass sich über die Atemluft aufgenommenes, radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Die Einnahme der Tabletten schützt zwar die Schilddrüse vor radioaktivem Jod, hingegen nicht den Körper vor radioaktiver Strahlung.

Abgabe der Tabletten

Sobald die Bevölkerung angewiesen wird, die Jodtabletten bereitzulegen, müssen die Tabletten umgehend abgegeben werden: an alle Ihre Mitarbeitenden und an alle weiteren Personen, die sich in Ihrem Gebäude aufhalten. Jede Person erhält einen Blister mit 6 Tabletten.

Einnahme der Tabletten

Falls die Behörden nach dem Bereitlegen der Tabletten auch deren Einnahme anordnen, sind diese rasch mit reichlich Flüssigkeit und möglichst nicht auf nüchternen Magen einzunehmen. Die Einnahme kann durch Auflösen in einem beliebigen Getränk erleichtert werden (Lösung nicht haltbar, sofort trinken).

Aufbewahrung

Inhalt

Jede einzelne Tablettenpackung enthält 2 Blister à 6 Kaliumiodid 65 SERB Tabletten.

Lagerungsbedingungen

Bitte Lagerpackung nicht öffnen. An einem für Kinder unzugänglichen Ort trocken und bei Raumtemperatur (15–25 °C) aufbewahren.

Empfohlene Dosierung

Neugeborene (auch gestillte Säuglinge behandelte Mütter) bis 1 Monat:

¼ Tablette am 1. Tag (einmalig)



Kinder ab dem 2. Monat bis 3 Jahre:

½ Tablette pro Tag



Kinder ab dem 4. Jahr bis 12 Jahre:

1 Tablette pro Tag



Kinder über 12 Jahre sowie Erwachsene:

2 Tabletten pro Tag



Schwangere und Stillende:

2 Tabletten auf einmal pro Tag, an max. 2 Tagen



Weitere Informationen zur Dosierung bei Kontraindikationen und in Spezialfällen finden Sie in der Packungsbeilage.

Die notwendige Dauer der Einnahme wird durch die Behörden bekannt gegeben. Auch wenn die Einnahme der Jodtabletten über mehrere Tage hinweg angeordnet wird, gelten für Schwangere, Stillende und Neugeborene die obigen Einschränkungen.

Jodtabletten sind eine wirksame Massnahme für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Personen bis zu 45 Jahren zur Vorbeugung von Schilddrüsenkrebs. Für Personen über 45 Jahre ist eine Einnahme der Jodtabletten nicht mehr empfohlen. Falls Personen über 45 Jahre in Betracht ziehen, im Ereignisfall Jodtabletten einzunehmen, erhalten sie in der Arztpraxis, Apotheke oder Drogerie weitere Auskünfte.

Weitere Informationen

Informationen zu den Kaliumiodid 65 SERB Tabletten finden Sie online unter: www.jodtabletten.ch

Informationen zu Schutzmassnahmen, Verhaltensanweisungen und allgemeinen Aspekten rund um Gefährdungssituationen finden Sie auf der Website der Nationalen Alarmzentrale: www.naz.ch

Kontakt

Geschäftsstelle Jodtabletten Schweiz
031 380 79 77, info@jodtabletten.ch,
www.jodtabletten.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eine vorsorgliche Massnahme der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
zum Schutz der Bevölkerung